

SELECCIÓN

- 1) ¿Cuál de las siguientes opciones representa la ecuación de la circunferencia cuyo centro es $C(-3, -5)$ y su radio es 7?

a) $x^2 + y^2 - 15 = 0$

b) $x^2 + y^2 - 83 = 0$

c) $x^2 + y^2 - 6x - 10y - 15 = 0$

d) $x^2 + y^2 + 6x + 10y - 15 = 0$

- 2) ¿Cuál de las siguientes opciones representa la ecuación ordinaria de la circunferencia para la ecuación $x^2 + y^2 - 8x + 9y - 74 = 0$?

a) $(x+4)^2 + \left(y + \frac{9}{2}\right)^2 = \frac{441}{4}$

b) $(x-4)^2 + \left(y + \frac{9}{2}\right)^2 = \frac{441}{4}$

c) $(x-4)^2 + \left(y - \frac{9}{2}\right)^2 = \frac{441}{4}$

d) $(x+4)^2 + \left(y - \frac{9}{2}\right)^2 = \frac{441}{4}$

- 3) En México se encuentra un reloj floral, como se muestra en la figura, que posee una carátula floral circular de 10m de diámetro. A este reloj lo adornan 20 mil plantas de diferentes especies. ¿Cuál es la ecuación ordinaria de la circunferencia si su centro está en el punto A (6,2)?

- a) $x^2 + y^2 - 15 = 0$
- b) $x^2 + y^2 - 115 = 0$
- c) $x^2 + y^2 - 12x - 4y + 15 = 0$
- d) $x^2 + y^2 + 12x - 4y - 15 = 0$



- 4) ¿Cuál es la ecuación de una recta tangente a la circunferencia dada por $x^2 + y^2 - 2x + 3y - 18 = 0$, si la recta pasa por el punto de tangencia P (2,3)?

- a) $y = 2x - 1$
- b) $y = \frac{-3}{2}x + 6$
- c) $y = \frac{-2}{3}x + \frac{13}{3}$
- d) $y = \frac{-2}{9}x + \frac{31}{9}$

5) Una ecuación de una recta paralela a la recta dada por la ecuación $3y - 5 = -2x$ es

a) $y = \frac{3}{2}x - 5$

b) $y = \frac{2}{3}x - 5$

c) $y = \frac{-3}{2}x + 5$

d) $y = \frac{-2}{3}x + 5$


6) De acuerdo con los datos de la gráfica, si $\ell_1 \perp \ell_2$, entonces una ecuación que determina a la recta ℓ_2 es

a) $y = 2x + 4$

b) $y = \frac{1}{2}x + 1$

c) $y = -2x - 4$


d) $y = \frac{-1}{2}x - 2$



7) La nueva ecuación de la circunferencia dada por $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 3 = 0$, después de una traslación que mueve el punto $P(3, -2)$ al origen del sistema de coordenadas corresponde a

- a) $x^2 + y^2 = 16$
- b) $x^2 + y^2 = -16$
- c) $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 24 = 0$
- d) $x^2 + y^2 - 12x + 8y + 20 = 0$

Considere la siguiente información para responder las preguntas 8, 9 y 10:



8) ¿Cuál es la medida del ángulo α ?

- a) 36°
- b) 60°
- c) 72°
- d) 90°

9) ¿Cuál es aproximadamente el área del pentágono?

- a) $26,15 \text{ cm}^2$
- b) $65,39 \text{ cm}^2$
- c) $130,77 \text{ cm}^2$
- d) $261,54 \text{ cm}^2$

10) ¿Cuál es aproximadamente el perímetro del pentágono?

- a) 21,85 cm
- b) 37,05 cm
- c) 43,59 cm
- d) 46,53 cm

11) Al trasladar el centro de la circunferencia dada por $x^2 + y^2 - 36 = 0$ al punto $P(-2, 4)$ la ecuación ordinaria de la circunferencia que se obtiene es


a) $(x+2)^2 + (y-4)^2 = 36$

b) $(x-2)^2 + (y+4)^2 = 36$

c) $(x-4)^2 + (y+16)^2 = 36$

d) $(x+4)^2 + (y-16)^2 = 36$

12) Considere la siguiente figura en la que los valores se dan en centímetros:



De acuerdo con los datos de la figura, ¿Cuál es aproximadamente el perímetro del cuadrilátero ABCD?

a) 15,60 cm

b) 13,28 cm


c) 11,84 cm

d) 10,42 cm

13) En un polígono regular, la suma de las medidas de los ángulos internos y externos es 1980° . ¿Cuál es el total de diagonales de ese polígono?

- a) 14
- b) 28
- c) 44
- d) 88

14) Considere la siguiente figura en la que e es el eje de simetría del $\triangle ABC$ y del $\triangle DEF$, y e' es el eje de simetría del $\triangle DEF$ y del $\triangle GIH$:



De acuerdo con los datos de la figura anterior, considere las siguientes proposiciones:

- I. A es homólogo con F, con respecto al eje de simetría e .
- II. $\overline{DE}$ es homólogo con $\overline{GI}$, con respecto al eje de simetría e' .


¿Cuáles de ellas son verdaderas?

- a) Ambas
- b) Ninguna
- c) Solo la I
- d) Solo la II

15) Considere el siguiente contexto:

El canal de agua


Daniel tiene que salir de su casa (R), llenar un recipiente de agua y llevarlo a casa de sus abuelos (A), como se muestra en la figura. Tome en cuenta que el canal es el eje de simetría, R y R' son puntos homólogos.



De acuerdo con el contexto anterior El canal de agua, ¿cuál es el camino más corto que puede recorrer Daniel?

- a) El que va de R hasta C
- b) El que va de R' hasta A
- c) El que va de R hasta C y de c hasta A
- d) El que va de R hasta R', de R' hasta C y de C hasta A

16) Considere la siguiente figura:



De acuerdo con los datos de la figura, el cuadrilátero EFGH con respecto al cuadrilátero ABCD presenta una homotecia de razón


a) $k = 2$

b) $k = 6$

c) $k = \frac{1}{2}$

d) $k = \frac{1}{3}$

17) Considere la siguiente figura:




Cada $\square$
representa un
cuadrado de lado
1 unidad

De acuerdo con los datos de la figura, ¿Cuál transformación presenta el $\triangle A'B'C'$ con respecto al $\triangle ABC$?

- a) Rotación
- b) Traslación
- c) Homotecia
- d) Reflexión con respecto al eje y.

18) Considere la siguiente figura:




Cada $\square$
representa un
cuadrado de lado
1 unidad

Si al $\triangle ABC$ se le aplica una traslación de vector $z(3,4)$, entonces, ¿Cuáles serían las coordenadas de los nuevos vértices para el $\triangle A'B'C'$ después de la traslación?

- a) $A'(8,2); B'(3,4); C'(7,6)$
- b) $A'(2,8); B'(4,3); C'(6,7)$
- c) $A'(5,12); B'(7,7); C'(9,11)$
- d) $A'(11,6); B'(6,8); C'(10,10)$

19) Considere la siguiente figura que representa un cilindro circular recto:



P y Q son los centros de las
bases del cilindro.

S – Q – R

Si la $m\overline{PQ} = 10\text{cm}$, la $m\overline{SR} = 6\text{cm}$ y la $m\overline{KQ} = \sqrt{109}\text{cm}$, entonces, ¿cuál es el área lateral del cilindro?


- a) $30\pi\text{cm}^2$
- b) $60\pi\text{cm}^2$
- c) $90\pi\text{cm}^2$
- d) $6\pi\sqrt{109}\text{cm}^2$

20) Si en un cono circular recto la medida de la altura es 12cm y la medida del diámetro de la base es 18 cm, entonces el área lateral es:

- a) $24\pi\text{cm}^2$
- b) $135\pi\text{cm}^2$
- c) $18\pi\sqrt{21}\text{cm}^2$
- d) $18\pi\sqrt{117}\text{cm}^2$

Considere la siguiente información para responder las preguntas 21 y 22:

Se le presenta una esfera de centro P que ha sido cortada por un plano π .



T es un punto e la circunferencia.

Q es el centro de la sección obtenida al hacer el corte.

21) ¿Qué nombre recibe la sección plana al realizarse el corte?

- a) Elipse
- b) Parábola
- c) Hipérbola
- d) Circunferencia

22) ¿Qué nombre recibe el $\overline{PT}$?

- a) Recta
- b) Radio
- c) Cuerda
- d) Diámetro


23) El área lateral de un cilindro circular recto es 60 cm y la medida de su radio es 3cm, ¿Cuál es la medida de su altura?

- a) 7 cm
- b) 18 cm
- c) $\frac{10}{\pi} \text{ cm}$
- d) $\frac{10-3\pi}{\pi} \text{ cm}$

24) La expresión $]-3,8]$ corresponde a

- a) $\{x / x \in \mathbb{R}, -3 \leq x \leq 8\}$
- b) $\{x / x \in \mathbb{R}, -3 \leq x < 8\}$
- c) $\{x / x \in \mathbb{R}, -3 < x \leq 8\}$
- d) $\{x / x \in \mathbb{R}, -3 < x < 8\}$

25) Considere la siguiente gráfica:



De acuerdo con los datos de la gráfica anterior, ¿Cuál es la representación del intervalo por comprensión?

- a) $\{x / x \in \mathbb{R}, -2 \leq x \leq 0\}$
- b) $\{x / x \in \mathbb{R}, -2 \leq x < 0\}$
- c) $\{x / x \in \mathbb{R}, -2 < x \leq 0\}$
- d) $\{x / x \in \mathbb{R}, -2 < x < 0\}$

26) Dados dos conjuntos A y B , con $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ y $B = \{5, 6, 7\}$, $A \cup B$ corresponde a

- a) $\{5\}$
- b) $\{5, 6, 7\}$
- c) $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$
- d) $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$

27) Dados dos conjuntos A y B , con $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ y $B = \{1, 3, 5, 7, 9\}$, si A es el conjunto universo, entonces el complemento $\ll B^o \gg$ de B es

- a) $\{0, 9\}$
- b) $\{0, 2, 4, 6, 8\}$
- c) $\{0, 1, 3, 5, 7, 9\}$
- d) $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

28) considere las siguientes relaciones:

I. $f: \{-1, 0, 2\} \rightarrow \{0, 1, 3\}$, con $f(x) = x + 1$

II. $g: \{-4, 1, 9\} \rightarrow \{-2, 1, 3\}$, con $g(x) = \sqrt{x}$


¿Cuáles de las relaciones anteriores corresponden a funciones?

- a) Ambas
- b) Ninguna
- c) Solo la I
- d) Solo la II

29) Considere el siguiente contexto:

Índice de Precios al Consumidos (IPC)

El Índice de Precios al consumidor (IPC), base junio 2015, se calcula mediante una investigación de los precios reportados por 3100 establecimientos sobre bienes y servicios. La recopilación de precios se realiza en las regiones de planificación del país con mayor concentración de población, según el censo 2011. La siguiente gráfica muestra el IPC desde el año 2008 hasta el año 2015.



Adaptado de: <http://www.inec.go.cr>

De acuerdo con el contexto Índice de Precios al Consumidor (IPC), considere las siguientes proposiciones:

¿Cuáles de ellas son verdaderas?

- a) Ambas
- b) Ninguna
- c) Solo la I
- d) Solo la II

- I. Del año 2013 al año 2015, el IPC creció
- II. El IPC en el año 2012 fue inferior al 6%

30) Si f es la función dada por $f(x) = \frac{2-3x}{2}$, entonces $f\left(\frac{1}{3}\right)$ es

a) $\frac{1}{2}$

b) $\frac{3}{2}$

c) $\frac{4}{3}$

d) $\frac{4}{9}$

31) Sean f y g dos funciones con $f(x) = 2x - 3$ y con $g(x) = x^2$. ¿Cuál es el criterio de $(g \circ f)$?

a) $(g \circ f)(x) = 2x^2 - 3$

b) $(g \circ f)(x) = 4x^2 - 9$

c) $(g \circ f)(x) = 4x^2 - 6x + 9$

d) $(g \circ f)(x) = 4x^2 - 12x + 9$

32) Si f es la función dada por $f(x) = \sqrt{2+x} - 3$, entonces el dominio de f es

a) $]-\infty, -2[$

b) $]-\infty, -2]$

c) $[-2, +\infty[$

d) $]-2, +\infty[$

33) La pendiente de la recta que contiene los puntos $(-2, 3)$ y $(-4, 8)$ es

a) $\frac{5}{6}$

b) $\frac{2}{11}$

c) $\frac{-5}{2}$

d) $\frac{-5}{6}$


34) De acuerdo con los datos de la gráfica, ¿Cuál es una ecuación para la recta ℓ ?

a) $y = x - 3$

b) $y = x + 3$

c) $y = -x + 3$

d) $y = -x - 3$



35) El eje de simetría de la gráfica de la función f dada por $f(x) = -x^2 - 6x$ es

- a) $x = 3$
- b) $x = 9$
- c) $x = -3$
- d) $x = -9$

36) El punto donde la recta definida por $\frac{2}{3}x - 2y = 5$ se interseca con el eje
« x » corresponde a

- a) $\left(0, \frac{15}{2}\right)$
- b) $\left(\frac{15}{2}, 0\right)$
- c) $\left(0, -\frac{5}{2}\right)$
- d) $\left(-\frac{5}{2}, 0\right)$

37) Considere las siguientes proposiciones referidas a la función f dada por :

$$f(x) = \left(\frac{7}{6}\right)^x$$


- I. f es decreciente.
- II. El ámbito de f es
- III. El punto pertenece al gráfico de f .

¿Cuáles de ellas son verdaderas?

- a) Todas
- b) Solo la I y la II
- c) Solo la I y la III
- d) Solo la II y la III

38) Considere las siguientes proposiciones, referidas a la gráfica de la función logarítmica f dada por $f(x) = \log_a x$:

- I. $0 < a < 1$
- II. f es creciente



¿Cuáles de ellas son verdaderas?

- a) Ambas
- b) Ninguna
- c) Solo la I
- d) Solo la II

39) Un grupo musical firmó un contrato para vender discos, donde su ingreso $\ll I(x) \gg$ en colones, por concepto de las ventas $\ll x \gg$, en colones, corresponde a $I(x) = 5\,750\,000 + 0,08x$. ¿De cuánto debe ser la venta para obtener un ingreso de ₡8 740 000?

- a) ₡239 200
- b) ₡6 449 200
- c) ₡37 375 000
- d) ₡181 125 000

40) La altura $\ll h(t) \gg$, en metros, de un objeto está dado por $h(t) = 10t - 5t^2$, donde $\ll t \gg$ es el tiempo en segundos. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza el objeto?

- a) 1 m
- b) 4 m
- c) 5 m
- d) 6 m

41) Considere las siguientes proposiciones referidas al sistema de ecuaciones

dado por
$$\begin{cases} 5x-2y=-3 \\ -15x+6y=9 \end{cases} :$$

I. Las rectas se intersecan en un único punto.

II. La solución del sistema es $\{(1,4)\}$.

¿Cuáles de ellas son verdaderas?

- a) Ambas
- b) Ninguna
- c) Solo la I
- d) Solo la II

42) Dos empleados de una misma empresa reciben sus salarios según la cantidad de años completos laborados. El empleado A recibe un salario base de ¢500.000 y una bonificación por cada anualidad de ¢10.000. el empleado B recibe un salario base de ¢600.000 y una bonificación por cada anualidad de ¢5000. ¿Cuántos años deben transcurrir para que ambos empleados ganen la misma cantidad de salario?

- a) 10
- b) 12
- c) 20
- d) 22

43) La expresión $\log(8x^2) - \log(0,5x)$ es equivalente a

a) $8 \log 2$

b) $\log(8x)$

c) $\log(16x)$

d) $\log\left(\frac{15x}{2}\right)$

44) La relación entre el tiempo $\ll t \gg$, en horas y el crecimiento de una población $\ll P \gg$ de amebas, está dada por $\log_2\left(\frac{P}{k}\right) = t$, donde $\ll k \gg$ es la población inicial de amebas. Si se observa una población inicial de 6 amebas, entonces, ¿Cuántas amebas habrá en 8 horas?

a) 48

b) 96

c) 384

d) 1536

45) Considere la siguiente información sobre un estudio estadístico:

Se ha registrado el peso (masa) en kilogramos de 250 estudiantes de un colegio. Al resumir los datos se obtuvo que la mediana es 67,4 kg, la moda es 65 kg y la media aritmética es 74 kg.


De acuerdo con la información anterior, se puede afirmar con certeza que en los 250 estudiantes,

- a) El peso más usual es 65 kg
- b) Exactamente 125 pesan 74 kg
- c) Al menos un estudiante peso 67,4 kg
- d) Al menos 125 pesan menos de 65 kg

46) Si al graficar una distribución de frecuencias de un grupo de datos, se observa que tiene una asimetría negativa, entonces con certeza se cumple que

- a) $M_e < \bar{x}$
- b) $M_e = \bar{x}$
- c) $M_o = M_e$
- d) $M_o < M_e$

47) Observe la siguiente gráfica de una distribución de frecuencias:



De acuerdo con la gráfica anterior, se cumple que

a) $a = \bar{x}$

b) $c = \bar{x}$

c) $a = M_e$

d) $b = M_o$

- 48) En un colegio, la evaluación de Cívica en casa periodo se lleva a cabo de acuerdo con la siguiente tabla, en la que aparecen también las notas obtenidas por Andrea y Patricia en uno de los periodos:

Componentes a evaluar	Valor porcentual	Notas de Andrea	Notas de Patricia
Prueba escrita	35	63	72
Trabajo cotidiano	15	84	70
Proyecto	40	60	71
Asistencia	5	98	95
Concepto	5	98	98
Total	100		

Si Andrea y Patricia son estudiantes de ese colegio y necesitan una nota promedio de 70 o más para aprobar el periodo, entonces

- a) Andrea aprobó el periodo.
- b) Patricia reprobó el periodo
- c) Ninguna de ellas aprobó el periodo
- d) Patricia tuvo una nota promedio mayor que la de Andrea

Considere el siguiente contexto y responda las preguntas 49 y 50:

Las Calderas

Las Calderas de una planta de energía de vapor a alta presión tuvieron las siguientes eficiencias en porcentajes:

90,3 91,6 90,9 90,4 90,3 91,0 87,9 89,4


49) ¿Cuál es aproximadamente la variancia de las eficiencias, en porcentajes, de las calderas?

- a) 1,13
- b) 1,24
- c) 1,30
- d) 1.31

50) ¿Cuál es el recorrido de las eficiencias, en porcentajes, de las calderas?

- a) 0,90
- b) 3,70
- c) 90,23
- d) 90,35

- 51) Considere la información referida a la comparación de la distribución de las edades, de los integrantes de dos grupos de 20 personas cada uno, que están representadas en el siguiente diagrama:



De acuerdo con la información anterior, considere las siguientes proposiciones:

- I. Las edades comprendidas entre el 25% y el 50% de la población representada en la caja "a" están más dispersas que las edades comprendidas entre el 25% y el 50% de la población representada en la caja "b".
- II. El recorrido intercuartílico de Q_1 a Q_3 de la población representada en la caja "a" es de 12 años.

¿Cuáles de ellas son verdaderas?

- a) Ambas
- b) Ninguna
- c) Solo la I
- d) Solo la II

Considere el siguiente contexto y responda las preguntas 52 y 53:

La masa media de los niños de una clase es de 58,2 kg. Y su desviación estándar es 3,1 kg. La masa media de las niñas de esa clase es 52,4 kg y su desviación estándar es 5,2 kg.

52) ¿Cuál es aproximadamente el coeficiente de variación de la masa media de los niños y el de las niñas, respectivamente?

- a) 5,3% y 9,9%
- b) 0,53% y 0,99%
- c) 18,77% y 10,08%
- d) 55,10% y 47,20%

53) Considere las siguientes proposiciones:

- I. La masa de los niños posee mayor variabilidad que la masa de las niñas.
- II. La masa promedio de los niños es mayor que la masa promedio de las niñas.

¿Cuáles de ellas son verdaderas?

- a) Ambas
- b) Ninguna
- c) Solo la I
- d) Solo la II

54) Considere el experimento de escoger un número natural del 1 al 12. Si el evento A es: que el número escogido sea par y el evento B es: que el número escogido sea múltiplo de tres, entonces con certeza

- a) $A \cap B = \{6, 12\}$
- b) $A \cup B = \{3, 6, 9, 12\}$
- c) $A \cap B = \{3, 6, 9, 12\}$
- d) $A \cup B = \{2, 4, 6, 8, 10, 12\}$

55) Considere el experimento de sacar dos bolas de una caja que contiene bolas blancas (B), azules (A) y rojas (R). Si las bolas poseen la misma forma y tamaño, y el evento M es: que las bolas del mismo color, entonces con certeza el complemento $\ll M^c \gg$ de m es

- a) $\{AA, RR, BB\}$
- b) $\{BR, RB, BA, AB\}$
- c) $\{AA, BB, RR, BA, RA\}$
- d) $\{AB, AR, BA, BR, RA, RB\}$

56) Considere la siguiente información:

En el experimento de lanzar un dado legal y registrar el número que sale en la cara superior, interesan dos eventos:

A: que el número sea impar.

B: que el número sea un 4.

Con base en la información anterior, considere las siguientes proposiciones:

- I. El evento A es el complemento del evento B
- II. Los eventos A y B son mutuamente excluyentes.

¿Cuáles de ellas son verdaderas?

- a) Ambas
- b) Ninguna
- c) Solo la I
- d) Solo la II

57) Se lanzan dos dados legales y se registra la suma de los puntos de las caras superiores. ¿cuál es la probabilidad de que la suma se amayor a que 5?

- a) 0,11
- b) 0,28
- c) 0,36
- d) 0,72

Considere el siguiente enunciado y responda las preguntas 58, 59 y 60:

El 30% de los estudiantes de un colegio practica el fútbol, el 40% practica baloncesto y el 10% practica ambos deportes. Se elige un estudiante al azar.

58) ¿Cuál es la probabilidad de que el estudiante elegido no practique fútbol ni practique baloncesto?

- a) 0,10
- b) 0,30
- c) 0,40
- d) 0,80

59) Si el estudiante elegido practica fútbol, ¿Cuál es aproximadamente la probabilidad de que practique baloncesto?

- a) 0,25
- b) 0,33
- c) 0,67
- d) 1,33

60) Si el estudiante elegido practica baloncesto, ¿Cuál es la probabilidad de que practique fútbol?

- a) 0,25
- b) 0,33
- c) 0,67
- d) 1,33

FÓRMULAS	
Fórmula de Herón (s: semiperímetro, a, b y c son las medidas de los lados del triángulo)	$A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$
Probabilidad de la unión (eventos A y B)	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
Probabilidad para eventos A y B mutuamente excluyentes	$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
Probabilidad del complemento	$P(A^c) = 1 - P(A)$
Ecuación de la circunferencia con centro en c(a,b) y radio r	$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$
Distancia "d" entre dos puntos	$d((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$

Simbología	Triángulo equilátero	Cuadrado	Hexágono regular
r radio	$h = \frac{\ell\sqrt{3}}{2}$	$\ell = \frac{d\sqrt{2}}{2}$	$a = \frac{r\sqrt{3}}{2}$
d diagonal			
a apotema	$a = \frac{h}{3}$		
ℓ lado			
h altura			

POLÍGONOS REGULARES	
Suma de las medidas de los ángulos internos s: suma de las medidas de los ángulos internos n: número de lados del polígono	$s = 180^\circ (n - 2)$
Medida de un ángulo interno i: ángulo interno n: número de lados del polígono	$m\angle i = \frac{180^\circ (n - 2)}{n}$
Medida del ángulo central n: número de lados del polígono c: ángulo central	$m\angle c = \frac{360^\circ}{n}$
Medida de un ángulo externo n: número de lados del polígono e: ángulo externo	$m\angle e = \frac{360^\circ}{n}$
Número de diagonales D: número de diagonales n: número de lados del polígono	$D = \frac{n(n - 3)}{2}$
Área P: perímetro, a: apotema	$A = \frac{P \cdot a}{2}$

ÁREA DE CUERPOS GEOMÉTRICOS	
FIGURA	ÁREA TOTAL
Cubo	$A_T = 6a^2$
Pirámide	$A_T = A_B + A_L$
Prisma	$A_T = A_B + A_L$
Esfera	$A_T = 4\pi r^2$
Cono (circular recto)	$A_T = \pi r(r + g)$
Cilindro (circular recto)	$A_T = 2\pi r(r + h)$

SIMBOLOGÍA			
h: altura	a: arista	A_L : área lateral	g: generatriz
A_b : área de la base	r: radio	A_B : área basal	A_T : área total

SOLUCIONARIO

1	D	11	A	21	D	31	D	41	B	51	D
2	B	12	C	22	B	32	C	42	C	52	A
3	C	13	C	23	C	33	C	43	C	53	D
4	D	14	D	24	C	34	C	44	D	54	A
5	D	15	C	25	C	35	C	45	A	55	D
6	C	16	A	26	D	36	B	46	D	56	D
7	A	17	A	27	B	37	D	47	B	57	D
8	C	18	C	28	C	38	C	48	D	58	C
9	C	19	B	29	D	39	C	49	C	59	B
10	C	20	B	30	A	40	C	50	B	60	A